

壳寡糖对脂多糖诱导猪空肠上皮细胞氧化损伤的作用

肖定福¹ 钟佳¹ 刘进辉² 李文平^{2*}

(1.湖南农业大学动物科学技术学院, 长沙 410128; 2.湖南农业大学动物医学院, 长沙 410128)

摘要: 本试验旨在通过脂多糖(LPS)诱导猪空肠上皮细胞(IPEC-J2)来建立氧化应激模型, 探讨壳寡糖(COS)的抗氧化作用效果。采用噻唑蓝(MTT)法检测LPS和COS对IPEC-J2作用12、24、48 h后, 细胞增殖活性的变化; 选择适宜浓度LPS(1.0 $\mu\text{g/mL}$)和COS(200 $\mu\text{g/mL}$)作用于IPEC-J2, 分为对照组、LPS组、COS组、LPS+COS组。采用Western Blot法检测核因子E2相关因子2(Nrf2)、血红素氧合酶-1(HO-1)蛋白的表达; 试剂盒检测超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性及丙二醛(MDA)的含量。结果表明: 1.0 $\mu\text{g/mL}$ 的LPS对IPEC-J2作用24 h, 细胞增殖的抑制率为41.6%, 为造模的最适浓度和作用时间; COS在一定浓度范围内对IPEC-J2有增殖作用, 其浓度为200 $\mu\text{g/mL}$ 时效果最佳, 作用时间为24 h时, 细胞增殖率达到126.3%。LPS+COS组较对照组的SOD、CAT活性和MDA含量差异不显著($P>0.05$), Nrf2和HO-1蛋白相对表达量显著升高($P<0.05$); LPS+COS组较LPS组的Nrf2蛋白相对表达量显著升高($P<0.05$), HO-1有升高趋势, 但差异不显著($P>0.05$), SOD、CAT活性显著升高($P<0.05$), MDA含量显著降低($P<0.05$)。由此可见, LPS诱导IPEC-J2氧化应激, 而COS可进一步促进Nrf2和HO-1蛋白的高表达, 并提高抗氧化酶的活性, 降低氧化产物含量, 从而增强细胞对氧化应激的抵抗力, 起到保护作用。

关键词: 壳寡糖; 脂多糖; 猪空肠上皮细胞; 氧化应激; 抗氧化作用

中图分类号: S811.3

文献标识码:

文章编号:

氧化应激是机体自由基生成增加或(和)清除能力降低, 导致机体氧化和抗氧化两者失衡, 自由基大量累积造成机体损伤^[1]。肠道黏膜是宿主防御病原微生物的第一道防线, 而肠上皮细胞是肠道黏膜屏障的重要组成部分, 肠上皮细胞的损伤是肠功能障碍的重要病理基础。在多种生理、病理、饮食或环境不当等情况下, 肠上皮细胞都能产生严重的氧化应激, 过多的自由基的累积可导致肠上皮细胞受损, 从而发生肠功能障碍^[2]。壳寡糖(chitooligosaccharide, COS)是壳聚糖(chitosan, CTS)生物降解后的产物, 水溶性好, 具有

收稿日期: 2016-01-07

基金项目: 国家自然科学基金青年项目(31301985); 中国博士后科学基金项目(2014M562111, 2015T80871); 湖南省科技厅项目(2015RS4035)

作者简介: 肖定福(1977-), 女, 湖南娄底人, 副教授, 博士, 研究方向为单胃动物营养。E-mail: xiaodingfu2001@163.com。

*通信作者: 李文平, 教授, 硕士生导师, E-mail: liwenping7222@163.com

多种生物功效，如抗癌^[3]、增强免疫^[4-5]、抗氧化^[6-8]、促生长^[9]和抑菌^[10]等，是一种具有广阔前景的天然产品。本项目研究通过建立猪空肠上皮细胞氧化应激模型，来探讨 COS 的抗氧化活性及作用机理，为其临床应用提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试剂

猪空肠上皮细胞（IPEC-J2）由中科院亚热带农业生态研究所提供；COS（90%脱乙酰度，平均分子质量<5 000 u）由中国科学院大连化学物理研究所提供；脂多糖（lipopolysaccharide,LPS）[大肠杆菌（*Escherichia coli*）O55:B5]购于 Sigma 公司，10 mg/支；核因子 E2 相关因子 2(Nrf2)抗体（C-20）、血红素氧合酶-1(HO-1)抗体（C-105）均购自圣克鲁斯生物技术有限公司。

1.2 细胞培养

IPEC-J2 于含 10%胎牛血清和 1%双抗的 DMEM basic(1×)培养基中，在 37 °C、5% CO₂、90%相对湿度的培养箱中培养，隔天换液，待细胞贴壁生长到 80%~90%时进行传代。

1.3 噻唑蓝（MTT）法检测细胞活率

取对数生长期的 IPEC-J2 调整至 5×10^4 /孔接种于 96 孔板中，每孔 200 μ L，置于培养箱中培养 24 h，换无血清培养基，并分别加不同浓度的 LPS（0、0.1、1.0、10.0 μ g/mL）和 COS（0、50、100、200、400 μ g/mL）继续培养 12、24、48 h，每组设置 6 个复孔，到时间点后分别加 5 mg/mL 的 MTT 20 μ L 继续置于培养箱中孵育 4 h，小心吸弃上清，用磷酸盐缓冲液(PBS)洗 2 次，每孔加 150 μ L 二甲基亚砷（DMSO）室温摇晃 15 min，使蓝紫色结晶充分溶解，用酶联免疫检测仪测定各孔在 490 nm 波长处的吸光值。试验重复 3 次。

1.4 细胞样品收集

取对数生长期的 IPEC-J2 调整至 1×10^6 /孔接种于 6 孔板中，待细胞贴壁生长至 80%左右，进行加样作用 24 h，试验分为对照组（不加 LPS 和 COS）、1.0 μ g/mL LPS 组、200 μ g/mL COS 组、1 μ g/mL LPS+200 μ g/mL COS 组，作用完后，用预冷的 PBS 洗涤细胞 3 次，加入细胞裂解液，于冰上裂解 30 min，用细胞刮棒刮取细胞，转移至离心管中，4 °C、12 000 r/min 离心 15 min，取上清，用二辛可宁酸（BCA）法蛋白定量，分装于-80 °C保存备用。

1.5 Western Blot 检测蛋白表达

取蛋白样品，用十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）法分离蛋白，将电泳分离的蛋白转移到偏二氟乙烯（PVDF）膜上，再用 5%的脱脂奶粉室温缓慢摇荡封闭 2 h，分别加入兔抗 Nrf2、HO-1（1:1 000 稀释）于 4 °C 下孵育过夜，经磷酸盐吐温缓冲液（TBST）洗涤 3 次（5 min/次）后，再用辣根酶标记的山羊抗兔免疫球蛋白 G（IgG）（1:5 000 稀释）

室温孵育 2 h, 经 TBST 洗涤 3 次 (5 min/次), 与化学发光剂反应 1 min, 在 Image Quant LAS 4 000 mini 化学发光成像仪下显示并记录结果。试验以 β 微管蛋白 (β -tubulin) 作为内参, 试验重复 3 次。

1.6 抗氧化酶及氧化产物的检测

取细胞样品, 采用硫代巴比妥酸比色法检测丙二醛 (MDA) 含量, 钼酸铵比色法检测过氧化氢酶 (CAT) 活性, 黄嘌呤氧化酶比色法检测超氧化物歧化酶 (SOD) 活性, 试剂盒均购自南京建成生物工程研究所, 其试验操作均严格按照试剂盒说明书进行。

1.7 统计分析

试验数据采用 SPSS 19.0 统计分析软件的 t 检验法进行单因素方差分析比较, 以 $P<0.05$ 为差异显著, 结果用平均值 \pm 标准误表示。

2 结果与分析

2.1 LPS 对 IPEC-J2 增殖活性的抑制作用

由表 1 可见, 不同浓度的 LPS 对 IPEC-J2 增殖活性的抑制作用有一定的差异, 且具有一定的时间依赖性。LPS 浓度在 0.1 $\mu\text{g/mL}$ 时, 对细胞的抑制作用较低, 作用 12、24 h 时与对照组 (不加 LPS) 无显著差异 ($P>0.05$); LPS 浓度在 1.0 $\mu\text{g/mL}$ 时, 对细胞有一定的抑制作用, 作用 24、48 h 时与对照组差异显著和极显著 ($P<0.05$ 和 $P<0.01$), 作用 24 h 时, 细胞增殖活性抑制率为 41.6%, 为造模的最佳作用浓度和时间; LPS 浓度为 10.0 $\mu\text{g/mL}$ 时, 对细胞的损伤严重, 细胞活率很低, 与对照组差异极显著 ($P<0.01$)。

表 1 LPS 对 IPEC-J2 细胞增殖的影响

Table 1 Effects of LPS on IPEC-J2 proliferation ($n=6$)

LPS 浓度	OD 值 OD value		
LPS concentration/($\mu\text{g/mL}$)	12 h	24 h	48 h
0 (对照 Control)	0.212 \pm 0.007	0.331 \pm 0.011	0.333 \pm 0.015
0.1	0.207 \pm 0.022	0.303 \pm 0.019	0.297 \pm 0.023*
1.0	0.199 \pm 0.009	0.217 \pm 0.008*	0.201 \pm 0.037**
10.0	0.107 \pm 0.025**	0.103 \pm 0.013**	0.097 \pm 0.010**

*表示与对照组比较差异显著 ($P<0.05$); **表示与对照组比较差异极显著 ($P<0.01$)。表 2 同。

* means significant difference compared with the control group ($P<0.05$); ** means extremely significant difference compared with the control group ($P<0.01$). The same as Table 2.

2.2 COS 对 IPEC-J2 增殖活性的促进作用

由表 2 可见,不同浓度的 COS 对 IPEC-J2 增殖活性的促进作用不同,而同一浓度的 COS 对细胞的增殖作用也具有一定的时间依赖性。与对照组相比, COS 浓度为 50 $\mu\text{g/mL}$ 时,对细胞增殖的影响不显著 ($P>0.05$); COS 浓度为 100 $\mu\text{g/mL}$ 时,作用 24、48 h 时对细胞增殖的影响显著 ($P<0.05$); COS 浓度为 200 $\mu\text{g/mL}$ 和 400 $\mu\text{g/mL}$ 时,作用 24、48 h 时对细胞的增殖率显著提高 ($P<0.05$),且在 COS 浓度为 200 $\mu\text{g/mL}$ 时相对效果更好。

表 2 COS 对 IPEC-J2 增殖的影响

Table 2 Effects of COS on IPEC-J2 proliferation ($n=6$)

COS 浓度	OD 值 OD value		
COS concentration/($\mu\text{g/mL}$)	12 h	24 h	48 h
0 (对照 Control)	0.212 ± 0.007	0.331 ± 0.011	0.333 ± 0.015
50	0.207 ± 0.009	0.337 ± 0.013	0.346 ± 0.010
100	0.237 ± 0.012	$0.396\pm0.024^*$	$0.411\pm0.011^*$
200	0.241 ± 0.008	$0.403\pm0.007^*$	$0.427\pm0.018^*$
400	0.255 ± 0.019	$0.393\pm0.010^*$	$0.392\pm0.021^*$

2.3 Nrf2 和 HO-1 蛋白的相对表达量

由表 3 得知,LPS 组的 Nrf2 和 HO-1 蛋白的相对表达量较对照组都有显著提高($P<0.05$); LPS+COS 组的 Nrf2 和 HO-1 蛋白的相对表达量较 LPS 组进一步提高,且 Nrf2 蛋白的相对表达量显著高于 LPS 组($P<0.05$),但 HO-1 蛋白相对表达量与 LPS 组差异不显著($P>0.05$)。

表 3 Nrf2 和 HO-1 蛋白在各细胞组中的相对表达量

Table 3 The relative expression level of Nrf2 and HO-1 protein in each cell group ($n=5$)

项目	对照组	LPS 组	COS 组	LPS+COS 组
Items	Control group	LPS group	COS group	LPS+COS group
核因子 E2 相关因子 2 Nrf2	0.395 ± 0.088	0.989 ± 0.089^a	0.546 ± 0.051	1.377 ± 0.103^{ab}
血红素氧合酶-1	0.237 ± 0.061	0.546 ± 0.145^a	0.250 ± 0.017	0.630 ± 0.081^a
HO-1				

^a表示与对照组比较差异显著 ($P<0.05$); ^b表示与 LPS 组比较差异显著 ($P<0.05$)。下表同。
^a means significant difference compared with the control group ($P<0.05$); ^b means significant difference compared with the LPS group ($P<0.05$) . The same as below.

2.4 SOD、CAT 活性和 MDA 含量

由表 4 可知, LPS 组较对照组的 SOD、CAT 活性显著降低 ($P<0.05$), MDA 含量显著

升高 ($P<0.05$)；LPS+COS 组较 LPS 组的 SOD、CAT 活性显著升高 ($P<0.05$)，MDA 含量显著降低 ($P<0.05$)，较对照组各项差异不显著 ($P>0.05$)。

表 4 各细胞组中 SOD、CAT 活性和 MDA 含量的检测结果

Table 4 The test results of SOD, CAT activities and MDA content in each cell group (n=6)

项目	对照组	LPS 组	COS 组	LPS+COS 组
Items	Control group	LPS group	COS group	LPS+COS group
超氧化物歧化酶	101.43±4.31	87.34±1.64 ^a	109.44±1.09	97.87±6.03 ^b
SOD				
过氧化氢酶 CAT	9.83±0.18	4.24±0.50 ^a	10.13±0.42	7.57±0.80 ^b
丙二醛 MDA	1.07±0.06	1.77±0.29 ^a	1.10±0.64	1.21±0.40 ^b

3 讨 论

如今，天然活性物质越来越受到各行各业的关注，已成为“高效、绿色、安全”的代名词。COS 来源丰富，广泛存在于低等动植物中，如甲壳动物外壳、藻类的细胞壁等^[11]。在体外和体内的大量研究报道，COS 在抗氧化方面发挥着重要的作用，具有清除氧自由基、降低氧化产物含量、提高抗氧化酶活性等功能^[12-17]。本研究除了进一步验证 COS 对抗氧化酶活性及氧化产物含量的影响，也探讨了 COS 对抗氧化反应信号通路 Keap1-Nrf2/抗氧化反应元件 (ARE) 中的核心成员 Nrf2 及其下游因子 HO-1 的作用，从而揭示 COS 抗氧化作用的可能信号通路或靶点。

LPS 是革兰氏阴性细菌细胞壁中的成分，当细菌细胞壁被破坏而释放出来，是内毒素中的一种，也是一种典型的肠毒素。LPS 能刺激机体产生大量的活性氧自由基，从而导致机体氧化应激、炎症等一系列反应。用 LPS 诱导氧化应激模型具有实际意义，在许多研究中得到应用和探讨，如王晓等^[18]用 LPS 成功建立了大鼠胰岛细胞氧化应激模型，进一步探讨了 α -硫辛酸的抗氧化和抗凋亡的作用机制；又如齐策等^[19]用 LPS 诱导小鼠腹腔巨噬细胞氧化应激模型，通过检测细胞的脂质过氧化程度，从而探究了维生素 C-磷脂复合物的抗氧化作用。

Nrf2 在机体绝大部分组织中表达，是调控机体细胞、组织及器官中氧化还原平衡的主要组成部分，当 Nrf2 被活化入核后，能与 ARE 识别并结合，然后启动下游一系列解毒和抗氧化因子的基因表达，如醌氧化还原酶-1 (NQO1)、谷胱甘肽硫转移酶 (GST)、SOD、CAT、还原性谷胱甘肽 (GSH) 等，而这些基因的表达都与机体的抗氧化活性有极其重要的关联，对机体的氧化还原平衡有关键性的作用^[20-21]。HO-1 又称为热休克蛋白 32，可以被多种物质或刺激因素诱导表达，如热休克、缺血、辐射、低氧、高氧、重金属盐等，发挥强大

的细胞保护作用, HO-1 的细胞保护作用主要与它的催化分解产物一氧化碳、胆绿素、胆红素、亚铁离子有关, 其中, 胆绿素、胆红素、亚铁离子与抗氧化的作用有紧密联系^[22], 而研究发现, Nrf2 是调控 HO-1 表达的一种重要的蛋白合成信号因子^[23-24]。

从试验结果分析, LPS 诱导 IPEC-J2 氧化应激, Nrf2 被激活, 并进一步诱导下游 HO-1 的表达, 对细胞起到一定的保护作用, 但这种保护作用不足以抵抗细胞的氧化损伤, 细胞的抗氧化酶 (SOD、CAT) 活性降低, 抗氧化产物 (MDA) 增多; 而 COS 能进一步促使 Nrf2 高表达, 并诱导下游基因 HO-1 表达, 提高抗氧化酶 (SOD、CAT) 活性, 同时降低抗氧化产物 (MDA) 含量, 增强了细胞对氧化应激的耐受能力, 从而对细胞起到保护能力。所以, 从试验结果可以推测 COS 的抗氧化作用与抗氧化反应信号通路 Nrf2/ARE 及 HO-1 有一定的关联。

4 结 论

LPS 诱导 IPEC-J2 细胞氧化应激, 而 COS 可进一步促进 Nrf2 和 HO-1 蛋白的高表达, 并提高抗氧化酶的活性, 降低氧化产物含量, 从而增强细胞对氧化应激的抵抗力, 起到保护作用。

参考文献:

- [1] SOHAL R S, ALLEN R G. Oxidative stress as a causal factor in differentiation and aging: a unifying hypothesis[J]. *Experimental Gerontology*, 1990, 25(6): 499–525.
- [2] TANG J, JIANG Y, TANG Y, et al. Effects of propofol on damage of rat intestinal epithelial cells induced by heat stress and lipopolysaccharides[J]. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 2013, 46(6): 507–512.
- [3] CHUA B Y, KOBAISI M A, ZENG W G, et al. Chitosan microparticles and nanoparticles as biocompatible delivery vehicles for peptide and protein-based immunocontraceptive vaccines[J]. *Molecular Pharmaceutics*, 2012, 9(1): 81–90.
- [4] YIN Y L, TANG Z R, SUN Z H, et al. Effect of galacto-mannan-oligosaccharides or chitosan supplementation on cytoimmunity and humoral immunity in early-weaned piglets [J]. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 2008, 21(5): 723–731.
- [5] SHARMA S, MUKKUR T K S, BENSON H A E, et al. Enhanced immune response against pertussis toxoid by IgA-loaded chitosan-dextran sulfate nanoparticles[J]. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2012, 101(1): 233–244.
- [6] 肖定福, 唐志如, 印遇龙, 等. 壳聚糖对大肠杆菌攻毒仔猪生长性能和抗氧化状况的影响[J]. *激光生物学报*, 2011, 20(6): 741–746.

- [7] 杨艳.壳寡糖,氨基葡萄糖及其衍生物的抗氧化功能研究[D].博士学位论文.青岛:中国海洋大学,2005.
- [8] YAO Q,SUN T,ZHOU D X,et al.Antioxidant activity of carboxymethyl chitosan with different substituted degrees[J].Agricultural Science & Technology,2008,9(1):5–7,59.
- [9] TANG Z R,YIN Y L,NYACHOTI C M,et al.Effect of dietary supplementation of chitosan and galacto- mannan-oligosaccharide on serum parameters and the insulin-like growth factor-I mRNA expression in early-weaned piglets[J].Domestic Animal Endocrinology,2005,28(4):430–441.
- [10] CHERVINETS V M,CHERVINETS I V,BONDARENKO V M,et al.Clinical effect of chitosan in bacterial vaginosis therapy[J].Zhurnal Mikrobiologii, Epidemiologii, I Immunobiologii,2011(5):76–79.
- [11] SHEPHERD R,READER S,FALSHAW A.Chitosan functional properties[J].Glycoconjugate Journal,1997,14(4):535–542.
- [12] XIE W M ,XU P X ,LIU Q .Antioxidant activity of water-soluble chitosan derivatives[J].Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,2001,11(13):1699–1701.
- [13] AHN B N, KIM J A, HIMAYA S W A,et al.Chitooligosaccharides attenuate UVB-induced damages in human dermal fibroblasts[J].Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology,2012,385(1):95–102.
- [14] QIAO Y,BAI X F,DU Y G.Chitosan oligosaccharides protect mice from LPS challenge by attenuation of inflammation and oxidative stress[J].International Immunopharmacology, 2011,11(1):121–127.
- [15] 张吉,刘洪涛,李秀英,等.壳寡糖对自由基的清除及对 N9 小胶质细胞的保护作用[J].食品科学,2010,31(7):81–85.
- [16] FENG T,DU Y M,LI J,et al.Antioxidant activity of half *N*- acetylated water-soluble chitosan *in vitro*[J].European Food Research and Technology,2006,225(1):133–138.
- [17] XU W,HUANG H C, LIN C J,et al.Chitooligosaccharides protect rat cortical neurons against copper induced damage by attenuating intracellular level of reactive oxygen species[J].Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,2010,20(10):3084–3088.
- [18] 王晓,葛勤敏. α -硫辛酸对脂多糖诱导的大鼠胰岛细胞氧化应激和凋亡的影响[J].上海医学,2014,37(9):751–754,823.

- [19] 齐策,金青哲,王兴国.维生素C-磷脂复合体抑制LPS诱导小鼠腹腔巨噬细胞氧化应激的研究[J].科技导报,2011,29(15):35–38.
- [20] NIOI P,MCMAHON M,ITOH K,et al.Identification of a novel Nrf2-regulated antioxidant response element (ARE) in the mouse NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 gene:reassessment of the ARE consensus sequence[J].Biochemical Journal,2003,374(2): 337–348.
- [21] 林谦,邱磊,云龙,等.核因子 E2 相关因子 2 调控机体抗氧化途径特性及其与畜禽的健康和肉品质的关系[J].动物营养学报,2014,26(6):1421–1429.
- [22] RYTER S W,OTTERBEIN L E,MORSE D, et al.Heme oxygenase /carbon monoxide signaling pathways:regulation and functional significance[J].Molecular and Cellular Biochemistry, 2002,234-235(1):249–263.
- [23] ALAM J,STEWART D,TOUCHARD C,et al.Nrf2,a Cap ‘n’ Collar transcription factor,regulates induction of the heme oxygenase-1 Gene[J].The Journal of Biological Chemistry,1999,274(37):26071–26078.
- [24] PAE H O,OH G S,JEONG S O,et al.1,2,3,4,6-penta-O-galloyl- β -D-glucose up-regulates heme oxygenase-1 expression by stimulating Nrf2 nuclear translocation in an extracellular signal-regulated kinase-dependent manner in HePG2 cells[J].World Journal of Gastroenterology,2006,12(2):214–221.

Effects of Chitooligosaccharide on Lipopolysaccharide Induced Oxidative Damage in Epithelial Cells of Pig Jejunum

XIAO Dingfu¹ ZHONG Jia¹ LIU Jinhui² LI Wenping^{2*}

(1. *College of Animal Science and Technology, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China*; 2. *College of Veterinary Medicine, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China*)

Abstract:This study was designed to investigate the effect of chitooligosaccharide (COS) on oxidative stress and used lipopolysaccharide (LPS) induced epithelial cells of pig jejunum (IPEC-J2) as an *in vitro* model of oxidative stress. The IPEC-J2 were incubated with LPS and COS for 12, 24 and 48 h,and then used methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide (MTT) to detect the activity of cell proliferation; the appropriate concentrations of LPS (1 μ g/mL) and COS (200 μ g/mL) were chosen in the IPEC-J2 cells, divided into control group, LPS group, COS group and LPS+COS group, and then detected the expression of NF-E2-related factor 2 (Nrf2) and

heme oxygenase 1 (HO-1) by Western Blot; and detected superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) activities and malonaldehyde (MDA) content by the kit. The results showed that the optimum concentration of LPS and incubated time for model was 1 $\mu\text{g/mL}$ and 24 h, the inhibition of cell proliferation was 41.6%; COS promoted the proliferation of IPEC-J2, worked the best when its concentration was 200 $\mu\text{g/mL}$ and incubated 24 h, the cell proliferation rate was 126.3%. Compared with the control group, LPS+COS group was not significantly different in SOD, CAT activities and MDA content ($P>0.05$), but Nrf2 and HO-1 protein expression was significantly higher ($P<0.05$); compared with LPS group, Nrf2 protein expression of LPS+COS group was significantly higher ($P<0.05$), and there was an increasing trend of HO-1 protein expression, but the difference was not significant ($P>0.05$), SOD, CAT activities were significantly increased and MDA content was significantly reduced ($P<0.05$). It is concluded that LPS induce oxidative stress of IPEC-J2, but COS can induce high expression of Nrf2 and HO-1 protein, and improve the activity of antioxidant enzymes, reduce the content of oxidative products, so increase cellular resistance to oxidative stress, and play a protective role.

Key words: chitooligosaccharide; lipopolysaccharide; IPEC-J2; oxidative stress; antioxidant

1